日消誌　2025；122：882―884

Q&A

維持透析患者の胃粘膜病変

佐藤慶佑　村田紗依　青柳　仁
阿部浩一郎　小田島慎也　山本貴嗣[1)]
笹島ゆう子[2)]

【問　題】

症例：50歳代女性.

主訴：なし.

病歴：X年に*Helicobacter pylori*の除菌歴あり.X＋4年に萎縮性胃炎の経過観察目的で上部消化管内視鏡を施行した.

既往歴：慢性腎臓病（5年前から維持透析導入），甲状腺乳頭部癌（手術後）.

内服薬：フロセミド，アジルサルタン，トルバプタン，炭酸ランタン，センノシド，アトルバスタチン，カルシトリオールカプセル，ダーブロック，ニフェジピン.

血液検査所見：RBC 376×10⁴/μL，Hb 11.6g/dL，WBC 4100/μL，Plt 20.3×10⁴/μL，TP 5.8g/dL，ALB 3.5g/dL，BUN 62.3mg/dL，Cr 12.5mg/



Figure 1.　白色光観察.



Figure 2.　白色光観察.

1）帝京大学医学部内科学講座　2）帝京大学医学部附属病院病理部

Gastric mucosal lesions in the patient on hemodialysis

Keisuke SATO, Sae MURATA, Hitoshi AOYAGI, Koichiro ABE, Shinya KODASHIMA, Takatsugu YAMAMOTO[1)] and Yuko SASAJIMA[2)]
1）Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine, 2）Department of Pathology, Teikyo University Hospital
Corresponding author：山本　貴嗣（ymmt@med.teikyo-u.ac.jp）



Figure 3. 白色光観察.



Figure 5. 白色光観察.



Figure 4. NBI 観察.

Figure 6. NBI 観察.

dL，Na 134mEq/L，K 5.9mEq/L，CL 101mEq/L，Ca 8.4mg/dL，P 8.3mg/dL，CRP 0.02mg/dL.

上部消化管内視鏡画像（Figure 1～6）：胃体下部大彎，胃体上部小彎に白色調の胃粘膜を認め，生検を施行した.

診断は？